

(9) Frenchay arm test

Réf : Heller A, Wade DT, Wood VA, Sunderland A, Langton-Hewer R, Ward E. Arm function after stroke : measurement and recovery after the first three months. *J Neurol Neurosurg Psychiatry* 1987 ; 50 : 714-9

Présentation

Cette évaluation de l'extrémité supérieure permet de vérifier l'utilisation du bras. Associer amplitudes passives, tonus musculaire, examen de la douleur, dynamométrie de la pince pouce-index.

Évolution du score

Total de 5 points – score 1 si réussi, 0 si incapable de réaliser l'action

Matériel nécessaire

- Crayon en graphite ou stylo, règle, feuille de papier ;
- Cylindre (12 mm x 5 cm) ;
- Gobelet ;
- Pince à linge à ressort ; bâton de 10 mm de diamètre ;
- Peigne à cheveux.

Épreuves	Peut = 1	Ne peut pas = 0
Stabiliser la règle sur le papier quand on trace un trait avec un crayon tenu par l'autre main.		
Saisir le cylindre.		
Porter un verre à moitié rempli d'eau à la bouche et boire dedans.		
Retirer et replacer une pince à linge sur un bâton de 10 mm de diamètre.		
Se peigner les cheveux ou imiter le geste.		